GDS Bretagne
L'action sanitaire ensemble

BIOSECURITE : Des clés simples pour maîtriser les principes de base chez soi

La transmission des maladies infectieuses

- Excrétion des bactéries et virus dans les sécrétions

Jetage nasal
(maladies respiratoires : gourme, grippe, rhino…)

Crottins
(maladies digestives : salmonellose, rotavirose…)



Autres : Urines, sécrétions génitales, salive, etc.

La transmission des maladies infectieuses

- Transmission de cheval à cheval par

Contact Direct



Contact Indirect



La biosécurité, socle de la prévention

Biosécurité

- Vidéo de présentation

Mesures de biosécurité équine - Chamberet - YouTube

La Biosécurité: c’est quoi? Pour qui?

- La **biosécurité** désigne l'ensemble des **mesures, pratiques** et **protocoles** mis en place pour :
  - **Prévenir l'introduction** des maladies infectieuses
  - **Réduire la propagation** et la transmission de maladies infectieuses **chez les chevaux dans la même structure**
  - **Réduire la propagation** et la transmission de maladies infectieuses **dans d’autres structures.**

Tous les détenteurs d’équidés sont concernés

Eviter l'introduction de pathogènes

- Introduction d'animaux



QUARANTAINE



Les recommandations de quarantaine

- Dans un **box / pré isolé** (surtout pas à l'entrée de la structure)
- Pendant **3 à 4 semaines** (Temps d'incubation des MI)
- Prise de température et **surveillance journalière**
- **Tests de détection** (maladies respiratoires)



Eviter l’introduction de pathogènes

Participation à des rassemblements

- **Vaccination** obligatoire / recommandée
- Avoir son **propre matériel** (seau, brosse…)
- **Suivi de la température** au retour

Créer un lot en pâture ou en bâtiment pour les chevaux qui sortent en compétitions/manifestations

Autres risques d'introduction

Liste non exhaustive

- **Les visiteurs**
  - Cavaliers, soigneurs, maréchal, vétérinaire…

- **L'alimentation**
  - Qualité et composition du fourrage (composition florale de la pâture avant fauchage)
    - Botulisme : Fourrage ou ensilage contaminé par des toxines
    - Mycotoxicose : Moissures dans les grains/moissons

  - Matériel agricole en commun

Eviter la circulation des pathogènes

- Principe de la marche en avant

⇔ Le circuit de soin : Des plus sensibles vers les moins sensibles

Poulains ➡ **Jeunes** ➡ **Adultes**

Terminer par les chevaux malades / quarantaine

Un zonage de la structure peut faciliter la mise en place de la marche en avant



Autres mesures pour limiter la circulation

- Protection de l'alimentation et l'abreuvement
  - Vigilance sur les lieux de stockage et protection
  - Gestion des espèces nuisibles (dératisation)

Exemple : Leptospirose ⇔ Eau/Foin contaminés par urine de rongeurs

- Attention également aux animaux domestiques

Biosécurité : Importance du Nettoyage / Désinfection

Les boxes	Régulièrement (vide sanitaire au moins une fois/an)
Les mangeoires, râteliers et abreuvoirs	Au moins une fois/semaine
Les circuits d'eau	Au moins une fois/an
Le matériel lié au poulinage, parage, tonte	A chaque utilisation
La zone d'équarrissage	Après chaque enlèvement
Le matériel de pansage, couvertures et harnachement	A minima une fois/an

Que faire en cas d’épidémie

La gestion de l'épidémie

Objectif: Limiter la propagation de la maladie dès les premiers signes
(abattement, jetage, hyperthermie, diarrhée, avortements…)

1- Contacter votre vétérinaire sanitaire

- Consultation
- Confirmation de l'infection (Analyses/Tests de détection spécifiques, Information au RESPE)
- Traitement adapté



2- Isolement de la structure :

- Stopper les entrées et sorties de chevaux
- Limiter les entrées et sorties des personnes (reporter les rdv non urgents)
- Interdire les chiens sur le site

La gestion de l'épidémie

Objectif: Limiter la propagation de la maladie dès les premiers signes
(abattement, jetage, hyperthermie, diarrhée, avortements…)

3- Zonage de la structure :

- Créer **3 groupes de chevaux** 1groupe /zone :

Zone rouge = chevaux malades (symptomatiques)

= Infirmerie ⇔ Box isolé, endroit non accessible aux autres animaux et visiteurs (Eloigné du box de poulinage et de l'entrée de la structure)

Zone orange = chevaux en contact direct avec les chevaux malades « à risque »
⇔ Les voisins de box, ou les chevaux de la même pâture en font partie

Zone verte = chevaux sains, apriori pas en contact avec les précédents …



La gestion de l'épidémie

Objectif: Limiter la propagation de la maladie dès les premiers signes
(abattement, jetage, hyperthermie, diarrhée, avortements…)

4- Zonage de la structure **et application de règles strictes de biosécurité entre zones**

- **Matérialisation des zones** à l'aide de panneaux, rubalise etc…
- Attribution à chaque zone son **propre équipement (fourche…) ET personnel**
- **Mettre à disposition des EPI** (gants, surbottes, charlottes, blouses jetables), poubelle, pédiluve et gel HA
- Réaliser la **marche en avant** (organiser un circuit de soins)
- **Surveillance +++ des chevaux des zones orange et verte** afin de les passer en zone rouge si apparition de symptômes (! temps d'incubation)

Gestion de l’épidémie : Sortir de l’isolement

- **Tests** de détection possibles dès la résolution des symptômes
- **Isolement** pendant 3 semaines après résolution des symptômes
- **Nettoyage et désinfection** des locaux et du matériel

La section Equine GDS Bretagne

ESPÈCE ÉQUINE

MES SERVICES

Audit Biosécurité

Prêt d'un kit de biosécurité + conseil

- En cas de rhinopneumonie/gourme

Aide financière

- Vaccination rhinopneumonie
- Coproscopie
- Test métrite

Analyse d'eau

- Bactériologique

+ Formations

Biosécurité : protéger aujourd'hui, préserver demain

Un cheval en bonne santé, c'est toute une filière qui avance

La biosécurité, c'est l'affaire de chacun, pour le bien de tous